レジメン登録申請書

平成 27年 4月 27日

印

申請医師名

レジメン委員長	レジメン委員医師	薬剤部 1	薬剤部 2	診療科名	外科
				所属部長	É
				<u>/</u> ///	F

下記のレジメンの登録を申請致します

がん種	レジメン名称
大腸がん	アバスチン(7.5mg/kg) + IRIS療法(3週/クール)

本文11万千	机片具	北上沙	+九 上 n土目目	- n d
楽剤名が		投 分		コメント
			投与日	
			(day1,day8 等)	
デカドロン注 6.6mg	1瓶			
デカドロン注 1.65mg	2A	Div	Day1	
アロキシ静注 0.75mg	1瓶		30min	
生食 100mL	1瓶			
				初回 90 分
アバスチン注	7.5 mg/kg	Div	Day1	2回目 60 分
生食 100mL	1 瓶		30-90min	3回目以降30分まで短縮可
生食50mL	1 瓶	フラッシュ用	Day1	
トポテシン注	$150 \mathrm{mg/m^2}$	Div	Day1	
5%糖液 250mL	1 瓶		90min	
			•	
TS-1(80-120mg/日)分2	、14 日間服用 7 日	間休薬		
	デカドロン注 1.65mg アロキシ静注 0.75mg 生食 100mL アバスチン注 生食 100mL 生食50mL トポテシン注 5%糖液 250mL	デカドロン注 6.6mg1瓶デカドロン注 1.65mg2Aアロキシ静注 0.75mg1瓶生食 100mL1瓶アバスチン注7.5mg/kg生食 100mL1瓶生食50mL1瓶トポテシン注150mg/m²5%糖液 250mL1瓶	デカドロン注 6.6mg1瓶デカドロン注 1.65mg2ADivアロキシ静注 0.75mg1瓶生食 100mL1瓶アバスチン注7.5mg/kgDiv生食 100mL1瓶生食 50mL1瓶フラッシュ用トポテシン注150mg/m²Div	ボカドロン注 6.6mg 1瓶

※実際に処方するように前投薬、輸液、ルート、時間、投与方法、コメント等を記載して下さい

- ※抗癌剤投与量は mg/m²,AUC で記載して下さい
- ※Rp.7以上のレジメンの場合は2枚に分けて記載して下さい。

インターバル日数 次のコースまでの標準期間 21日/クール
