レジメン登録申請書

平成 30 年 4 月 12 日

レジメン委員長	レジメン委員医師	薬剤部 1	薬剤部 2

診療科名　消化器内科

所属部長　印

申請医師名　印

下記のレジメンの登録を申請致します

がん種	レジメン名称
胃がん	サイラムザ(8mg/kg)＋weeklyアブラキサン(nab-PTX)療法

Rp	薬剤名称	投与量	投与法	投与時間 投与日 (day1,day8 等)	コメント
Rp.1	生食 250mL	1瓶	Div ルートキープ用	Day1、8、15	
Rp.2	デカドロン 6.6mg 生食 100mL	1 瓶 1瓶	Div 30 分かけて	Day1、8、15	
Rp.3	サイラムザ注 生食 250mL	8mg/kg 1瓶	Div 側管より 1 時間かけて	Day1、15 4週間 1 クール	サイラムザ＋生食＝ 250mL となるように調製 ■最初の2クール目までは 1 時間の観察を行なう Infusion reaction なければ、3 クール目から省略可
Rp.4	生食 50mL	1瓶			フラッシュ用
Rp.5	アブラキサン注 生食 50mL	100mg/m^2 1 瓶	Div	Day1、8、15 30 分	3 週連続投与、1 週休薬 →4 週間 1 クール
	【アブラキサン注調製方法】 1） 1瓶あたり生食 20mL をバイアル内壁伝いに、直接、内容物にかけないよう泡立ちに注意しながらゆっくりと注入する。 2） 内容物が確実に濡れるよう 5 分間以上バイアルを静置する。内容物が確実に濡れたら、均一な白色ないし黄色の懸濁液になるまで静かに円弧を描くように回したり、緩やかに上下に転倒を繰り返して混和する。 調製した懸濁液は必要量をバイアルから抜き取り、生食 50mL の生食を空にした後、ゆっくりと注入。				

インターバル日数 次のコースまでの標準期間	4週／クール	総コース数	